

	RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE TIMPANOSTOMÍA O TUBOS DE VENTILACIÓN		
	Proceso: Cuidado y Tratamiento	Código: CT-FO-129	Versión: 03

CUIDADOS CON SU ALIMENTACIÓN

- Durante el primer día evite tomar lácteos, tampoco debe tomar gaseosas, estos alimentos pueden ocasionarle vomito y muchas otras molestias.
- El primer día debe alimentarse con comidas blandas como gelatinas y paletas; consuma alimentos líquidos como jugos. Después del segundo día puede alimentarse con las comidas que sirven habitualmente en su casa.

MEDICAMENTOS Y CUIDADOS

- Muy importante no mojarse los oídos durante el baño, para lo cual se recomienda tapar el conducto con un algodón impregnado de vaselina.
- No debe bañarse en piscina hasta que su médico se lo autorice.
- Tome solamente los medicamentos ordenados por su médico; tenga en cuenta que debe iniciarse después de ingerido algún alimento.

NO SE ALARME

- La salida de líquido escaso por los oídos durante los primeros días es normal, recuerde que la función de los tubos es ventilar y drenar.

SEÑALES DE ALARMA

En caso de presentar cualquiera de las siguientes señales de alarma, debe comunicarse de inmediato con su médico:

- Presenta temperatura mayor de 38°C.
- La salida de líquido o sangre por el oído es abundante.
- Presenta salida de pus o detecta mal olor en el oído operado.

SU SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

Si aún no se ha comunicado con su médico puede llamar a la clínica al teléfono 2658584 ext. 170-177 tener presente que debe ser en horario de lunes a viernes de las 6:00 AM a las 9:00 PM o escribir al correo electrónico seguridad.paciente@clinicaorlant.com, para recibir las instrucciones.