

RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE IMPLANTE COCLEAR

Proceso: Cuidado y Tratamiento

Código: CT-FO-146

Versión: 03

Fecha de aprobación:
19 - Mayo - 2016

CUIDADOS GENERALES

- Guardar reposo relativo; puede caminar dentro de la casa, ver televisión o leer, NO hacer ejercicio, NO caminatas largas hasta que su médico se lo autorice.
- El paciente siempre debe estar acompañado en casa y en exteriores, para evitar caídas. Recuerde que el oído es el centro del equilibrio.
- No debe lavarse la cabeza hasta que su médico lo autorice.
- No sonarse la nariz durante los primeros días y para estornudar hágalo con la boca abierta para evitar fuerzas o presiones indebidas sobre el oído.
- Recuerde que el algodón, la gasa y el microporo que se le deja al paciente en el oído, NO se debe retirar hasta que el médico lo haga.
- Evitar la entrada de agua al oído después de UN MES de la última revisión hecha por el otorrino tratante.
- Dormir para el lado opuesto al operado.
- Evite asolearse, serenarse, hacer esfuerzos, ingerir licor.
- Si fuma, debe evitar el cigarrillo porque este retrasa el proceso de cicatrización
- No debe salir de la ciudad sin la autorización de su médico, pues los cambios de altura, presión y movimientos pueden estropearle la cirugía y causarle daños de difícil tratamiento.
- Puede presentar parálisis facial transitoria.
- Cuidar de entender sus necesidades mediante el mecanismo de escritura y lectura de labios.

CUIDADOS CON LA HERIDA

- Evitar humedecer la curación (gasa-microporo) que se coloca sobre el oído.
- Si observa rubor, calor, inflamación y dolor alrededor de la herida, en el conducto auditivo o en la oreja, consultar inmediatamente con el médico otorrino tratante.
- Si observa salida de abundante líquido, sangre o material purulento (pus) consultar con el médico otorrino tratante.
- Luego de que se le retiren los puntos de la herida quirúrgica, se debe lavar con abundante agua y jabón. Antes de realizar el lavado, tener la precaución de realizarse una buena higiene de manos, para así evitar infecciones en la herida quirúrgica. Si el conducto auditivo continúa con algodón o hiladilla, solo lavar la herida.
- Buena higiene personal.
- Buenas técnicas de limpieza del sitio de permanencia durante su recuperación.
- El vendaje debe permanecer fijo en su posición alrededor de la cabeza, por lo cual debe permanecer con su cabeza en posición decúbito supino o lateral al lado contrario al operado.
- Si el vendaje se moviliza, el familiar del paciente debe llamar al otorrinolaringólogo tratante para comunicarle, y de inmediato dirigirse a la Clínica de Otorrinolaringología de Antioquia, en donde se le colocara nuevamente el vendaje en el servicio de cirugía, ya que el vendaje es la principal herramienta para evitar complicaciones como: hematomas e infecciones.

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Clínica de Otorrinolaringología de Antioquia

S.A

Cualquier fotocopia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE IMPLANTE COCLEAR

Proceso: Cuidado y Tratamiento

Código: CT-FO-146

Versión: 03

Fecha de aprobación:
19 - Mayo - 2016

- El vendaje no se debe humedecer de ninguna forma.

CUIDADOS CON SU ALIMENTACIÓN

- Durante el primer día evite tomar lácteos, tampoco debe tomar gaseosas. Estos alimentos pueden ocasionarle vómito y muchas molestias.
- Se recomienda que durante el primer día consuma alimentos blandos y algunos líquidos como jugos, paletas, gelatinas, no ácidos; prefiera la papaya, mango, piña, guayaba, etc. Después del segundo día su alimentación puede ser normal.

MEDICAMENTOS Y CUIDADOS

- Tome solamente los medicamentos ordenados por su médico tratante.
- Evite la Aspirina®, Naproxeno®, Advil®, Ibuprofeno® y medicamentos naturistas.
- Consultar al médico tratante sobre medicamentos que se le estaban administrando antes de la cirugía y su administración post quirúrgica.
- En caso de dolor, NO se auto medique, consulte a su médico.
- Si presenta dolor de cabeza fuerte y continuo consultar inmediatamente.

NO SE ALARME

- Mareo en los 7 primeros días transcurridos después de la cirugía.
- Vómito en los 7 primeros días transcurridos después de la cirugía.
- Si presenta dolor e hinchazón leve en el oído en el cual se le realizó la intervención quirúrgica.
- Sensación de oído tapado.
- Salida de agua sangre por la herida quirúrgica.

SEÑALES DE ALARMA

En caso de presentar cualquiera de las siguientes señales de alarma, debe comunicarse de inmediato con su médico:

- El vómito y el mareo persisten o son muy frecuentes.
- Presenta temperatura mayor de 38°C.
- El sangrado por el oído es abundante.
- Presenta salida de pus (pus) o mal olor en el oído operado.
- El paciente presenta daño en el nervio facial, el cual se manifiesta con cambios en la anatomía de la cara, boca, ojo, ceja y frente desviado o sin movimiento.
- El paciente presenta rigidez de cuello o dolor de cabeza.
- Si el paciente presenta vértigo o mareo después de 8 días post quirúrgicos

SU SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS



RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE IMPLANTE COCLEAR

Proceso: Cuidado y Tratamiento

Código: CT-FO-146

Versión: 03

Fecha de aprobación:
19 - Mayo - 2016

Si aún no se ha comunicado con su médico puede llamar a la clínica al teléfono 2658584 ext. 170-177 tener presente que debe ser en horario de lunes a viernes de las 6:00AM a las 9:00PM o escribir al correo electrónico seguridad.paciente@clinicaorlant.com, para recibir las instrucciones.